

患者信息

YESCARTA™ 可能导致可致死的副作用。

如果您有以下这些症状，请立即致电或到您的肿瘤科医生处就诊或寻求紧急援助：

- 发烧（100.4°F/38°C 或以上）
- 眩晕或头晕
- 呼吸困难
- 严重的恶心、呕吐或腹泻
- 发冷或颤抖
- 快速或不规则的心跳
- 精神错乱
- 非常疲劳或虚弱

YESCARTA 是 Kite Pharma 的商标。
© 2017 Kite Pharma | CCRC-00011 02/2018



A GILEAD Company
2355 Utah Avenue, El Segundo, CA 90245



患者钱包卡

请您时刻随身携带这张卡。如果您去急诊室或看任何医生，请出示此卡。

告诉任何为您提供诊治的医疗保健提供者您正在接受 YESCARTA™ 治疗。

在接受 YESCARTA™ 治疗后的至少 4 周内，您应停留在您接受治疗的地点附近（2 小时内）。

医疗保健提供者的重要信息

肿瘤科主治医师姓名：

诊所电话：

下班后电话：

YESCARTA™ (axicabtagene ciloleucel) 输注日期：

- 该患者已接受 YESCARTA™ 治疗，这是一种靶向 CD19 的转基因自体 T 细胞免疫疗法

- YESCARTA™ 可引起细胞因子释放综合征 (Cytokine Release Syndrome, CRS) 和神经毒性，这可能会致命或危及生命。CRS 可能累及任何器官系统



- **请立即联系患者的肿瘤科医生以获取更多信息**