

患者さん向け情報

YESCARTA™は死亡に至る可能性がある副作用を引き起こすことがあります。

下記のいずれかの**症状**が現れた際は、**すぐにかかりつけ腫瘍専門医への連絡、受診または救急医療機関を受診してください。**

- 38°C以上の発熱
- 呼吸困難
- 悪寒または震えを伴う悪寒
- 意識障害
- 目まいまたは立ちくらみ
- 激しい吐き気、嘔吐または下痢
- 心拍が速いまたは不規則
- 激しい疲労感または脱力感

YESCARTAはKite Pharmaの商標です。
© 2017 Kite Pharma | CCRC-00036 02/2018



2355 Utah Avenue, El Segundo, CA 90245



患者カード

常に持ち歩いてください。救急外来や医師の診察を受ける際は、必ずこのカードを見せてください。

すべての医療提供者に、YESCARTA™の治療を受けていることを伝えてください。

YESCARTA™治療後、少なくとも4週間は、患者さんが治療を受けられた医療機関から2時間以内の近距離で過ごしてください。

医療提供者向け重要情報

治療提供している腫瘍専門医名：

連絡先：

時間外連絡先：

YESCARTA™ (axicabtagene ciloleucel) の投与日：

- この患者さんは、CD19を標的とする遺伝子改変自家移植T細胞免疫療法であるYESCARTA™を受けています。

- YESCARTA™は死亡や生命を脅かす可能性のあるサイトカイン放出症候群および神経毒性を引き起こすことがあります。サイトカイン放出症候群はあらゆる臓器に影響を与える可能性があります。



- 詳細が必要な場合は、すぐにかかりつけの腫瘍専門医へ連絡してください。