

## 시험대상자 정보

YESCARTA™는 사망으로 이어질 수 있는 부작용을 유발할 수 있습니다.

**다음과 같은 증상 중 어떤 것이든 발생하는 경우에는 즉시 종양전문의에게 연락 또는 진료를 받거나 응급 도움을 받으십시오.**

- 발열(100.4°F/38°C 이상)
- 어지러움 또는 현기증
- 호흡 곤란
- 중증의 오심, 구토, 또는 설사
- 오한 또는 오한 전율
- 빠르거나 불규칙한 심장박동
- 혼동
- 중증의 피로 또는 쇠약

YESCARTA는 Kite Pharma의 상표입니다.  
© 2017 Kite Pharma | CCRC-00041 03/2018



2355 Utah Avenue, El Segundo, CA 90245



# 시험대상자 지갑 카드

**이 카드를 항상 소지하십시오. 응급실에 가거나  
의사의 진료를 받는 경우 이 카드를 보여주십시오.**

진료를 받는 모든 의료인에게 귀하가 YESCARTA™를 투여 받고 있음을 알려십시오.

YESCARTA™를 투여받은 후 최소 4주간은 투여를 받은 곳과 가까운 곳(2시간 이내)에  
계십시오.

## 의료인을 위한 중요 정보

치료 종양전문의 이름:

---

진료실 전화:

---

진료시간 후 전화:

---

YESCARTA™ (axicabtagene ciloleucel) 주입 날짜:

---

- 이 시험대상자는 CD19 표적 유전자 조작 자가 T 세포 면역요법제인 YESCARTA™를 투여 받았습니다

- YESCARTA™는 사이토카인 방출 증후군(cytokine release syndrome, CRS)과 신경독성을 유발할 수 있으며, 이는 치명적이거나 생명을 위협할 수도 있습니다. CRS는 어떤 기관계와도 연관될 수 있습니다



- 보다 자세한 정보가 필요하시면 시험대상자의 종양전문의에게 즉시 연락하십시오