

Informações para o paciente

YESCARTA™ pode causar efeitos colaterais que podem levar à morte.

Ligue ou consulte o seu oncologista ou busque atendimento de emergência IMEDIATAMENTE se você tiver qualquer um desses sintomas:

- Febre (100.4°F/38°C ou mais alta)
- Tontura ou vertigem
- Dificuldade para respirar
- Enjoo, vômito ou diarreia intensos
- Calafrios ou tremores
- Batimentos cardíacos rápidos ou acelerados
- Confusão
- Cansaço ou fraqueza intensos

YESCARTA é marca comercial da Kite Pharma.
© 2017 Kite Pharma | CCRC-00033 02/2018



2355 Utah Avenue, El Segundo, CA 90245, EUA



Cartão de bolso para o paciente

**Leve este cartão com você o tempo inteiro.
MOSTRE ESTE CARTÃO se precisar ir à emergência
de um hospital ou a uma consulta médica.**

Diga a todos os profissionais que lhe atenderem que você está sendo tratado com YESCARTA™.

Fique perto (a 2 horas de viagem) do local em que você recebeu o tratamento por pelo menos 4 semanas após tomar YESCARTA™.

Informações importantes para profissionais de saúde

Nome do oncologista responsável:

Telefone do consultório:

Telefone particular:

Data da infusão do YESCARTA™ (ciloleucel de axicabtageno):

- Este paciente recebeu YESCARTA™, uma imunoterapia dirigida para CD19 de célula T autóloga geneticamente modificada

- YESCARTA™ pode causar síndrome de liberação de citocina (Cytokine Release Syndrome, CRS) e toxicidade neurológica, que podem ser fatais e ter risco de morte. A CRS pode envolver qualquer sistema orgânico



- **Entre em contato com o oncologista do paciente imediatamente para obter mais informações**