

Информация для пациента

YESCARTA™ может вызывать побочные эффекты, которые могут привести к смерти.

НЕМЕДЛЕННО обратитесь к врачу-онкологу или за экстренной медицинской помощью, если у вас наблюдаются какие-либо из следующих симптомов:

- Повышение температуры тела (100,4 °F/38 °C или выше)
- Затрудненное дыхание
- Озноб или потрясающий озноб
- Спутанность сознания
- Головокружение или предобморочное состояние
- Сильная тошнота, рвота или диарея
- Быстрое или нерегулярное сердцебиение
- Сильная усталость или слабость

YESCARTA является торговой маркой компании Kite Pharma.
© 2017 Kite Pharma | CCRC-00032 02/2018



2355 Utah Avenue, El Segundo, CA 90245



Карточка пациента

**Всегда носите эту карточку с собой.
ПОКАЗЫВАЙТЕ ЭТУ КАРТОЧКУ при посещении отделения неотложной помощи или обращении к врачу.**

Всем медицинским работникам, к которым вы обращаетесь, сообщайте о том, что получаете лечение препаратом YESCARTA™.

На протяжении не менее 4 недель после получения препарата YESCARTA™ оставайтесь в непосредственной близости от места проведения инфузии (на расстоянии до 2 часов пути).

Важная информация для медицинских работников

ФИО лечащего врача-онколога:

Рабочий телефон:

Телефон для связи в нерабочее время:

Дата получения инфузии YESCARTA™ (аксикабтаген силoleyсел):

- Этому пациенту вводился препарат YESCARTA™ — направленная на CD19 генетически модифицированная аутологичная Т-клеточная иммунотерапия

- **YESCARTA™ может вызывать синдром высвобождения цитокинов (СВЦ) и неврологическую токсичность, которые могут представлять угрозу для жизни или приводить к смерти пациента. СВЦ может проявляться в виде побочных эффектов со стороны любой системы органов**



- **Для получения более подробной информации немедленно свяжитесь с врачом-онкологом пациента**